

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### **ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ ЛИСТКЕ-ВКЛАДЫШЕ ДО НАЧАЛА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА**

Это лекарственное средство является препаратом БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА, которое Вы можете применять для лечения умеренных и преходящих расстройств, легко распознающихся и разрешающихся без необходимости обращения к помощи специалиста. Таким образом, данное лекарственное средство может быть приобретено без рецепта врача, но должно применяться правильно для гарантии его эффективности и уменьшения побочных эффектов:

- Для получения дополнительной информации и совета, обращайтесь к фармацевту
- Если после короткого лечения расстройство не проходит, пожалуйста, обратитесь за советом к врачу.

### **НОВАГО таблетки 50 мг**

Дименгидрилат

### **ЧТО ТАКОЕ НОВАГО?**

**Новаго** является антигистаминным препаратом с противорвотным действием, средством от тошноты и головокружения.

### **ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВАГО?**

**Новаго** применяется:

- для предупреждения рвоты, тошноты и головокружения, связанных с укачиванием в транспорте (укачивание в автомобиле, морская болезнь, воздушная болезнь).
- для профилактики и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных противоопухолевой терапией;
- при болезни Меньера.

### **КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?**

Не применяйте **Новаго**, если

- у Вас аллергия на действующее вещество или на какое-либо вспомогательное вещество;
- аллергия на другие антигистаминные средства;
- препарат противопоказан недоношенным и доношенным младенцам.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Препарат следует принимать с осторожностью у больных, страдающих глаукомой, гипертрофией простаты, другими синдромами задержки мочи, интестинальной обструкцией, бронхиальной астмой, эпилепсией.

### **КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПИЩА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА?**

Дименгидрилат усиливает эффекты

- веществ, угнетающих ЦНС, таких как алкоголь, барбитураты, другие снотворные, седативные средства и транквилизаторы. В случае сопутствующего применения данных веществ, следует обратить внимание на область их действия во избежание дополнительного седативного эффекта;
- антихолинэргических средств, включая антидепрессанты.

Если **Новаго** назначается одновременно с антибиотиками-аминогликозидами или другими ототоксическими препаратами, дименгидринат может замаскировать ранние симптомы ототоксичности, которые могут проявиться только после того, когда нарушения станут необратимыми.

**Вы должны проинформировать Вашего врача или фармацевта обо всех лекарственных препаратах, которые Вы принимаете или недавно принимали, даже если эти препараты отпускаются без рецепта врача.**

## **ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!**

*Когда препарат может применяться только по назначению врача*

- у больных, страдающих глаукомой, гипертрофией простаты, другими синдромами задержки мочи, интестинальной обструкцией, бронхиальной астмой, эпилепсией;
- у детей до 12 лет.

### ***Беременность и лактация***

**Новаго** нельзя применять во время беременности и в период лактации.

Препарат нельзя применять у младенцев.

**Проконсультируйтесь с врачом, если Вы планируете беременность.**

### ***Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами.***

Так как наиболее частым побочным эффектом **Новаго** (как и других антигистаминных препаратов) является седативный эффект и сонливость, то следует соблюдать осторожность при операциях, требующих особого внимания (управление автотранспортом и механизмами).

### **Важные сведения о некоторых компонентах НОВАГО**

**Новаго** содержит лактозу: если у Вас имеется непереносимость каких-либо сахаров, обратитесь к Вашему врачу до начала приема **Новаго**.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

### ***ДОЗИРОВКА***

#### *Укачивание в транспорте*

(укачивание в автомобиле, морская и воздушная болезнь):

Дети

от 3 до 6 лет – 1/4 - 1/2 таблетки за полчаса до начала путешествия, если необходимо, дозу можно повторить через 6-8 часов в сутки

от 6 до 12 лет

1/2 таблетки за полчаса до начала путешествия, если необходимо, дозу можно повторить через 6-8 часов, максимальная суточная доза 2 таблетки (4 половинки таблетки).

Взрослые и подростки (от 13 до 18 лет)

1 таблетка за полчаса до начала путешествия, если необходимо, дозу можно повторить через 3-4 часа, максимальная суточная доза 4 таблетки.

Начало применения за полчаса до путешествия и, если необходимо, повторное применение, для взрослых и подростков через 3-4 часа и для детей через 6-8 часов.

Обратитесь к врачу, если симптомы повторяются или Вы отметили изменение в их характеристиках.

*Профилактика и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных противоопухолевой терапией:*

дети с 3 до 6 лет – 1/4 - 1/2 таблетки 2-3 раза в сутки;

дети с 7 до 12 лет – 1/2 - 1 таблетка 2-3 раза в сутки;

дети старше 12 лет и взрослые – 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки;

*Болезнь Меньера:*

дети до 12 лет – 1/2 - 1 таблетка 2-3 раза в сутки;

дети старше 12 лет и взрослые 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Принимайте 1 таблетку ( 1/2 или 1/4 таблетки для детей) со стаканом воды или другого напитка (не алкогольного).

### **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ ПРЕПАРАТ В БОЛЬШЕЙ ДОЗИРОВКЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ?**

При передозировке, проявление седативных эффектов варьирует от легкой сонливости до глубокого сна. Сообщалось о психотических реакциях. При передозировке у детей могут наблюдаться возбуждение, бессонница, нервозность, тахикардия, дрожь, клонические судороги мышц, судорожные припадки. В случае неосторожного проглатывания большой дозы **Нового**, немедленно обратитесь к врачу или за неотложной помощью.

**ПРИ ПРИЕМЕ ДВОЙНОЙ ДОЗЫ НОВАГО ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ВАШЕГО ВРАЧА ИЛИ ФАРМАЦЕВТА.**

### **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Как и все лекарственные препараты, **Нового** может вызывать побочные эффекты, хотя они наблюдаются не у всех пациентов.

Нижеследующие критерии были использованы для классификации частоты побочных эффектов: очень часто  $\geq 1/10$ , часто  $\geq 1/100$  и  $< 1/10$ , нечасто  $\geq 1/1000$  и  $< 1/100$ .

*Нарушения иммунной системы*

Часто: кожные реакции.

*Метаболические расстройства и нарушения питания*

Часто: анорексия.

*Психические нарушения*

Нечасто: бессонница (особенно у детей), эйфория.

*Нарушения со стороны нервной системы*

Очень часто: уменьшение активности, сонливость.

Часто: головная боль.

Нечасто: головокружение, дрожь.

*Нарушения со стороны органов зрения*

Часто: нарушение аккомодации.

*Нарушения со стороны сердечной системы*

Нечасто: тахикардия.

*Нарушения со стороны сосудистой системы*

Нечасто: гипотензия.

*Нарушения со стороны пищеварения*

Часто: сухость во рту, тошнота.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей*

Часто: фотосенсибилизация.

*Нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы*

Часто: нарушения мочеиспускания.

*Системные нарушения и местные реакции*

Нечасто: астения.

*Следование инструкции снижает риск развития побочных эффектов.*

*Важно проинформировать Вашего врача при развитии побочных эффектов, которые не описаны в листке-вкладыше.*

*Попросите в аптеке и заполните специальную форму о развитии побочных эффектов.*

## **СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Дата окончания срока годности соответствует последнему дню месяца.

Препарат **Новаго** не требует специальных условий хранения.

**Предупреждение:** не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности указывается с учетом соблюдения условий хранения в неповрежденной упаковке.

Не выбрасывайте лекарство в водосток или бытовые отходы. Попросите фармацевта ликвидировать ненужное лекарство.

Эта мера позволит предупредить загрязнение окружающей среды.

**Хранить в недоступном для детей месте.**

Важно всегда иметь при себе информацию о препарате; поэтому храните листок-вкладыш вместе с упаковкой.

## **СОСТАВ**

Каждая таблетка содержит:

Действующее вещество: дименгидрилат 50 мг

Вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Препарат **Новаго** выпускается в форме таблеток по 50 мг. Каждая упаковка содержит 10 таблеток.

## **ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Индустрия Фармацевтика НОВА АРГЕНТИА С. п. А. – Виа Лованио 5 – 20121 Милан.

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A. - Via Lovanio 5 - 20121 Milan.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Индустрия Фармацевтика НОВА АРГЕНТИА С. п. А. – Виа Лованио 5 – 20121 Милан.

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A. - Via Lovanio 5 - 20121 Milan.